

とうやく いらい しょ 投薬 依頼 書

かき 下記のように とうやく ひつよう としますので、ほごしや か 代わって とうやく ご いらい いたします。

1 しん だん めい 診 断 名	
2 とうやく ひつようせい 投薬の必要性	
3 くすり な まえ 薬 の 名 前	
4 ようりょう くすり りょう 用 量 (薬 の 量)	
5 ようほう の かた 用 法 (飲 ませ 方)	
6 とう やく じ かん 投 薬 時 間	
7 とう やく き かん 投 薬 期 間	
8 そのたのねが そ の 他 の お 願 い	

令和 年 月 日

茨城県立伊奈特別支援学校長 殿

部 年 組

とうやく いらい しょ あわせて
投薬依頼書と併せて、

おくすり せつめい しょ ていしゆつ
お薬の説明書も提出して

ください。

じどうせい と し め い
児童生徒氏名

ほごしや し め い
保護者氏名



**きにゅうれい
記入例**

とう やく い らい しょ
投 薬 依 頼 書

かき 下記のように投薬を必要としますので、ほごしやに代わって投薬をご依頼いたします。

1 しん だん めい 診 断 名	(1) てんかん (2) 慢性気管支炎
2 とうやく ひつようせい 投薬の必要性	(1) てんかん発作を予防するため (2) 咳を鎮めるため
3 くすり の な まえ 薬 の 名 前	(1) ①デパケンR ②テグレトール (2) メジコン
4 ようりょう (くすり りょう) 用量 (薬の量)	(1) ①1錠 ②2錠 (2) 1錠
5 ようほう の かた 用法 (飲ませ方)	水と一緒に飲ませる
6 とう やく じ かん 投 薬 時 間	昼食後
7 とう やく き かん 投 薬 期 間	1年間
8 そのたのねが その他のお願い	テグレトールの作用が強くなることがあるので、 グレープフルーツやグレープフルーツジュースの摂取は 避けてください。

令和〇〇年〇月〇日

茨城県立伊奈特別支援学校長 殿

△ △ 部 ○ 年 □ 組

とうやくいらいしょ あわせて
投薬依頼書と併せて、

おくすり せつめいしょ ていしゅつ
お薬の説明書も提出して

ください。

じどうせいとしめい 〇〇 〇〇
児童生徒氏名

ほごしやしめい 〇〇 〇〇 ㊟
保護者氏名